

Thesis

Halle-Wittenberg

580421

Über die Erfolge

der Uterusausschabung bei
der Endometritis fungosa.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde in der Medicin und Chirurgie
welche

mit Genehmigung der hohen medicinischen Facultät
der vereinigten Friedrichs-Universität

Halle-Wittenberg

zugleich mit den Thesen

Sonnabend, den 5. Januar 1895, Mittags 12 Uhr.
öffentlich verteidigen wird

Heinrich Keil

approb. Arzt aus Erlangen.

Referent: Herr Prof. Dr. Fehling.

Opponenten:

Herr Goedecke, cand. med.
„ von Holst, cand. med.

Halle a. S.

Druck von Ehrhardt Karras.

1895.

M. L. S.

Dem Andenken seines Vaters
gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Es giebt wohl kaum eine zweite Frage auf dem Gebiete der Gynaekologie, über die im Laufe der Zeit so viel geschrieben, diskutiert und gestritten worden ist, als über die Behandlung der akuten und chronischen Endometritis. Sicherlich ist dies ein Beweis dafür, dass es noch keine Behandlungsart giebt, die sich allgemeiner Anerkennung erfreut, dass die Einen sich von dieser, die Anderen von jener Therapie bei dieser Erkrankung die besten Erfolge versprechen.

In Deutschland sind es allerdings heute nur noch verhältnismässig wenige unter den Gynaekologen, welche die Uterusausschabung — sei es vermittelst der gefenestrierten Curette, sei es mit dem scharfen Löffel — verwerfen; immerhin hat es lange gedauert, bis die um die Mitte dieses Jahrhunderts vorgeschlagene Ausschabung des Endometriums allgemein bekannt und angewendet wurde.

Es lohnt sich wahrlich der Mühe die früheren und jetzigen verschiedenen Behandlungsmethoden der Endometritis kurz zusammenzustellen, um daraus Schlüsse zu ziehen; und so habe ich es denn auf Veranlassung des Herrn Professor Fehling gerne unternommen, über die Folge der Endometritisbehandlung an hiesiger Klinik in Kaltenbach's Zeit zu berichten und so gleichzeitig einen casuistischen Beitrag zur Statistik der Entfernung

der Uterusschleimhaut bei chronischer Entzündung des Endometriums zu geben. Bevor ich jedoch auf dies meine eigentliche Aufgabe übergehe, sei es mir gestattet kurz über die Entstehung und Verbreitung der Curette zu berichten und damit die Geschichte der Behandlung der akuten und chronischen Endometritis zu besprechen, weil die Geschichte dieser mit der jener eng verknüpft ist.

Ziemlich spät erst begann man die Entzündung der Gebärmutter Schleimhaut energisch zu behandeln. Man begnügte sich in alter Zeit mit Verordnungen allgemeiner Art. Hippokrates empfahl gegen hartnäckige Entzündung und Leucorrhoe das Pulver von gebranntem Schwamm mit Wein (*de natura muliebri* cap. 85, 7—8) ausserdem Gewürze und balsamische Stoffe. Später gab man Abführmittel, z. B. Magnesia mit Rhabarber u. a. m. Ferner wurden absolute Ruhe, möglichste Reinhaltung der Genitalien, passende Diät und lauwarme Waschungen verordnet. Scultet — um die Mitte des 17. Jahrhunderts — macht Ausspülungen und Injectionen in die Vagina mit Kräuterabgüssen von Kamille, Lavendel und Balastridrian. Später wurden diese Abgüsse durch adstringierende Mittel ersetzt. Schwache Lösungen von Argemoneitric., Alaun, Zinc. sulf. traten an ihre Stelle und sind zum Teil auch heute noch in Anwendung. Gegen Schmerzen gab man als Gegenreiz Blasenpflaster, Senfteig und Brechweinstein. Daneben wurde grosser Wert gelegt auf kalte oder warme Wasserumschläge, auf Douchen und heisse Dämpfe wurden empfohlen. Innerlich wurde wohl auch Jod und Brom verordnet.

War die Erkrankung eine hochgradige, d. h. war die Entzündung der Gebärmutter Schleimhaut auch eine Vergrösserung des Uterus zu constatieren, wurde über starke Schmerzen, Ausfluss und profuse Blutungen

lagt, so ging man gegen diese therapeutisch, wohl auch mit dem Glüheisen vor. Immerhin war dieser Eingriff in verhältnissmässig seltener und wurde nur von wenigen Chirurgen (Sculdet 1684) ausgeführt.

Im allgemeinen war man also darauf angewiesen, mit äthetischen Mitteln, vaginalen Ausspülungen und Injectionen, sowie mit Verordnungen allgemeiner Art die heftigen Metrorragien zu bekämpfen.

Von einer operativen Behandlung wurde noch Abstand genommen. Von einer solchen hören wir erst um die Mitte unseres Jahrhunderts.

Simpson berichtete im J. 1850 (Monthly Journal, Edinburgh) über die Erfolge seiner Behandlung einer Anzahl von Fällen chronischer Blutung. Er erweiterte das collum uteri und kratzte alsdann die Granulationen im Endometrium mit dem Fingernagel ab. So führte er in einer Reihe von Fällen einen Stillstand der Metrorragien herbei. Auch von anderen Seiten wurde eine Abtragung der Erhöhungen und wulstigen Excrescenzen der Uterus-schleimhaut in jener Zeit empfohlen und diese mannigfachen Empfehlungen brachten Récamier auf den Gedanken, ein Instrument zu konstruiren, welches den Fingernagel ersetzen und zugleich die Möglichkeit geben sollte mit Leichtigkeit auch die im Corpus uteri gelegenen Schleimhautpartieen zu erreichen, was früher dem ins uterum eindringenden Finger wegen Raumangel mittheiliger nicht gelungen war. So schuf er die Curette, d. h. einen scharfen Löffel mit langem Stiel und nannte die Operation, die er damit ausführte, Abrasion mucosae oder Railage. Von anderer Seite wurde sie Curette-ment genannt. Wenn auch schon vor Récamier's eigener Bekanntmachung seines neuen Verfahrens Veröffentlichungen erschienen waren, in denen dieser operative

Eingriff warm empfohlen wurde, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass Récamier als erster den glücklichen Plan der Uterusausschabung durchgeführt, wenn auch nicht bekannt gemacht hat. Bald fanden sich eine Reihe von Anhängern der neuen Behandlungsart, aber die Zahl der Gegner, die ihr erwuchs, war doch viel grösser.

In Frankreich selbst waren es unter anderen Velpeau und Dubois, die Récamier's Vorschläge energisch zurückwiesen, namentlich Ersterer verurteilte den Eingriff aufschärfste und machte auf die Gefahren aufmerksam, die diese Operation mit sich brächte. Mögen seine Bedenken vielleicht übertrieben sein, etwas Wahres liegt aber in seinen Ausführungen, insofern, als das Curettement in der vor anti- resp. aseptischen Zeit ein viel gewagterer Eingriff war als heutzutage. Sicherlich ist der Operation damals häufig eine Infection des Endometriums, eine Peritonitis und Parametritis gefolgt.

Auch ausserhalb Frankreichs rief das Curettement einen lebhaften Wettstreit unter den Gynaekologen hervor. In England empfiehlt sie James Simpson und wird von vielen seiner Zeitgenossen deshalb energisch lang angefeindet. Nach einer Reihe von Jahren finden sie auch in Amerika Freunde. Marion Sims führt sie hier als Erster im Jahre 1862 aus. Deutschland verhielt sich zunächst noch ablehnend und so blieb es bis zum Anfang der siebziger Jahre. Olshausen hat das Verdienst der Uterusauskatzung vermittelst der gefensterten Curette von neuem empfohlen, ja ich möchte sagen überhaupt eingeführt zu haben. War doch selbst in Frankreich die *abrasio mucosae uteri*, dem Lande wo sie zuerst entstanden und auch am meisten Anklang gefunden hatte fast wieder in Vergessenheit geraten. Im Archiv für Gynaekologie (Band 8) berichtet Olshausen im J. 1871

genau und eingehend über neun Fälle, bei denen er in Folge chronischer Endometritis das Curettement ausgeführt hat. Abgesehen von dem grossen Vorteil, den eine Aus-
 schabung des cavum uteri in Bezug auf eine Diagnosen-
 stellung gewähre, bringe das Curettement den Nutzen
 mit, dass man „auf die sicherste und ungefährlichste Weise
 die Blutungsquelle beseitigt.“

Wie leicht begreiflich, erregte Olshausen's Ver-
 öffentlichung berechtigtes Aufsehen und die von ihm be-
 zugsichtigte Wirkung derselben blieb nicht aus. Noch in
 demselben Jahre curettirten Hegar und Kaltenbach in
 Freiburg; auch aus anderen Universitätskliniken lesen
 wir Berichte über Uterusauskrazungen und hören von
 den guten Erfolgen derselben bei bestehender Endome-
 titis. Trotzdem waren die Gegner noch nicht alle ver-
 ummt. Sagt doch Emmet im Jahre 1880, dass der
 menschliche Geist nichts Schädlicheres erfunden habe als
 die Curette. (Akademie der Med. Séance 10. Sept. 1889.)
 Auch Richelot beschränkte die Anwendung der Curette
 nur auf Fälle von chronischer Endometritis mit Fungo-
 maten und bestehenden Haemorrhagien. Bei akuter
 Endometritis erziele man eine allmähliche Heilung durch
 antiseptische Pflege, Jodoform und leichte Caustiken.
 Auch der Vorschlag, die Schultze (Jena) zur Behand-
 lung der Endometritis brachte, sei hier gedacht. Nur
 in wenigen Fällen hält er eine Auskrazung des Endo-
 metriums für geboten. Seine Behandlung besteht im
 wesentlichen in vaginalen und uterinen Ausspülungen.
 Nachdem der cervix uteri durch Laminaria gedehnt ist,
 macht er zunächst eine Uterusausspülung mit 3 % Soda-
 lösung, alsdann folgt die eigentliche desinficierende Spü-
 lung mit Sublimat 1 : 5000. Diese Ausspülungen müssen
 möglichst wiederholt werden und nach einem Zeitraum von

8—14 Tagen tritt Heilung ein. Apostoli in Paris, der sich viel um die Einführung der Elektrizität in die Reihe der gynaekologischen Heilmethoden bemüht hat, hat diese auch als Heilmittel der Endometritis gepriesen. Der Nutzen soll, wie Prochnowik und Späth gezeigt haben, in der Aetzwirkung bestehen. Sie constatirten an uteris, welche wegen carcinomatöser und auch myomatöser Erkrankung entfernt werden sollten und auf welche sie den galvanischen Strom hatten einwirken lassen, nach deren Exstirpation eine Verätzung der Gewebe, durch welche die oberflächlichen Schichten zerstört waren und bedenen auch in den tiefer liegenden Gewebspartieen insofern Veränderungen vorhanden waren, als in den Blut- und Lymphgefässen Coagulationen sich fanden.

Eine weitere Behandlungsart der Endometritis ist die von Dumontpallier vorgeschlagene. Dieser führt einen Stift, welcher aus einem Gemenge gleicher Theile von Roggenmehl und Chlorzink besteht, in den uterus ein und ätzt dadurch nicht nur die Schleimhaut, sondern auch die tiefer gelegenen Partieen des uterus. Statt der Chlorzinkstifte wurden später von ihm solche von cupr. sulf. empfohlen. In den meisten Fällen genüge ein einmaliges Einlegen, nach circa drei Wochen seien die Patienten geheilt. Zwar sind eine Anzahl Gynaekologen Frankreichs auf die Vorschläge Dumontpallier's eingegangen und behandeln auch jetzt noch die Endometritis in der von jenem angegebenen Weise, aber in Frankreich gerade erhoben sich gegen diese Therapie bald von so vielen Seiten Bedenken gewichtiger Art, dass eine grosse Anzahl Freunde Dumontpallier'scher Behandlung zur Auskratzung des uterus vermittelst der Curette zurückkehrte. Le Dentu, Doléris, Pichevin und viele andere hatten unangenehme Erfahrungen mit der Aetzur

emacht. Eine grosse Zahl von Obliteration des uterus als Folge dieser Eingriffes wurde von ihnen beobachtet. Auch Sterilität sei häufig eingetreten. Im allgemeinen sind es dieselben Bedenken, die man gegen die Behandlung vermittelt des galvanischen Stromes anführt: auch hier nicht nur eine Ausstossung der Uterusschleimhaut, sondern auch der tiefer gelegenen Gewebspartieen und damit die Unmöglichkeit späterer Conception.

Am treffendsten wird diese Methode von Pozzi charakterisiert. Dieser sagt: „Die Uterus Mucosa kann nur dann in den Normalzustand zurückkehren, wenn ein Theil des epithelialen Gewebes an der inneren Oberfläche des uterus nach der Aetzung bestehen bleibt. Da dies aber in den meisten Fällen in der von Dumontpallier vorgeschlagenen Behandlungsweise nicht statt hat, so bedeckt sich die uterine Wundfläche mit Narben; es treten ferner die Wundflächen in Contact und gelangen, indem sie sich mit wuchernden Excrescenzen bedecken zur Vereinigung, wodurch eine partielle oder totale Verwachsung der Uterushöhle herbeigeführt wird. Da dieser Vorgang sich indessen nur langsam entwickelt, so ist er begleitet von einer mehr oder weniger langen Periode scheinbarer Heilung; nur so lassen sich die Illusionen der Operateure und die günstigen statistischen Observationen erklären.“

In Deutschland hat die Anwendung der Chlorzinkstifte zur Behandlung der Endometritis wohl kaum Verbreitung gefunden. Nur von einzelnen wenigen Fällen wissen wir in der Litteratur. So versuchte z. B. Veitelin bei einem Fall der hämorrhagischen Form der Endometritis den Chlorzinkstift. Den Erwartungen entsprach nicht der Erfolg. „Trotz der Cauterisation traten intensive, eine starke Anaemie der Patientin herbei-

führende Hämorrhagien ein, dass Veit sich alsbald zur Totalexstirpation entschliessen musste, um das Leiden bei der Wurzel anzugreifen.

Eine Abänderung in der Chlorzinkbehandlung wurde von Rheinstädter in Köln zur Behandlung der chronischen Metritis und Endometritis getroffen. Er ätzt mit einer Lösung von Chlorzink und Aqua destill. ab. Auch diese Behandlungsmethode hat jedoch nicht die Beachtung gefunden, die man nach seinen Erfolgen hätte erwarten dürfen. Nur ganz vereinzelt finden sich in der Litteratur Angaben über Erfolge und Misserfolge dieser Behandlungsweise. Günstige Erfahrungen hat Dörfle mit derselben gemacht. Auch Bröse äussert sich in ähnlicher Weise wie dieser. Dagegen macht Amandin wohl mit Recht darauf aufmerksam, wie schwer es sei festzustellen, wie weit die Wirkung der Aetzung auf die Schleimhaut sich erstrecke, besonders ob dieselbe, wie dies bei der Curette doch feststeht, gerade da aufhöre, wo die Grenzlinie der Regenerationsfähigkeit des Endometriums beginnt.

Die Behandlung der Endometritis mittelst der Jodoformgazetamponade der Uterushöhle nach vorausgegangener Dilatation hat sich ebenfalls nur ganz vereinzelt Eingang verschaffen können. Nur noch ganz wenige Gynaekologen Frankreichs haben diese bis auf den heutigen Tag beibehalten.

Die Antwort auf die Frage, warum die meisten deutschen Gynaekologen die verschiedenen Vorschläge zur Behandlung der Endometritis nicht beachtet haben, liegt nahe. Sie hatten bereits eine Behandlungsart gefunden, mit deren Erfolg sie zufrieden waren und diese bestand in der Auskratzung der Uterushöhle mittelst der Curette oder auch mittelst des scharfen Löffels.

Es ist hier nicht der Ort, über alle die günstigen statistiken zu berichten, welche die verschiedenen Operateure über das Curettement bei der Endometritis gemacht haben. Kurz erwähnt seien nur die Arbeiten von Poléris, welcher über 440 Fälle von Curettement in den Jahren 1880—88 ohne jeglichen Unfall berichtet. Ebenso günstig lauten die Ergebnisse von Martin in Berlin, welcher mehr als 300 Auskratzungen ohne Zwischenfall ausführte. Auch Vogelbachs Bericht über die Erfolge der Uterusausschabung bei Endometritis an der Baseler Universitätsklinik, sowie eine ganze Reihe anderer Arbeiten auf diesem Gebiete ermutigen, diese Behandlung jeder anderen vorzuziehen. In neuester Zeit sprachen sich bei der Naturforscherversammlung in Halle Sept. 91 gelegentlich des Vortrags von Kaltenbach: „Zur Therapie der Endometritis“, nicht nur dieser selbst, sondern auch Olshausen, Mackenrodt, Döderlein und Pfannenstiel zu Gunsten des Curettements bei jeder Form der Endometritis aus. Nach den Ergebnissen, die Kaltenbach hier in seiner Klinik gehabt hat, war diese warme Empfehlung voll und ganz berechtigt. Veröffentlicht und zusammengestellt sind die Ergebnisse der Auskratzung bei der chronischen Endometritis aus hiesiger Klinik jedoch noch nicht und so habe ich es denn unternommen festzustellen, inwiefern die aus Kaltenbachs Zeit operierten Frauen von ihren Beschwerden geheilt sind. Der Bericht erstreckt sich von dem Jahre 1887 bis zum Dezember 1892, Nachforschungen nach noch aus späterer Zeit anzustellen, wurde deshalb unterlassen, weil nach unserer Ansicht mindestens ein Jahr seit der Operation vergangen sein muss, um von dem Erfolg resp. Misserfolg reden zu können.

Im ganzen sind nach den vorhandenen Kranken-

geschichten zu schliessen in diesem Zeitraum 198 Patientinnen wegen chronischer Endometritis behandelt. Bei allen wurde eine Auskratzung des Endometriums vorgenommen. Bemerkt sei nebenbei, dass alle Auskratzungen die im Anschluss an einen Abort vorgenommen werden, sowie die, die einer Diagnosenstellung dienen sollten — eine Zahl, die der obengenannten annähernd gleichkommen mag — hier nicht mit einbegriffen sind. Es handelt sich bei unseren Fällen nur um Endometritis glandularis und interstitialis, bei der die Curette zur Entfernung der hypertrophischen Schleimhaut in Anwendung gebracht wurde. Eine genaue mikroskopische Untersuchung ist nur in den wenigsten Fällen vorgenommen; wurden auffallend viele Massen aus der Uterushöhle herausbefördert oder sah die ausgekratzte Schleimhaut irgendwie verdächtig auf eine maligne Erkrankung aus, so ist sie jedoch nie unterblieben. In keinem einzigen Falle findet sich die Angabe, dass infolge mikroskopischer Untersuchung die Diagnose Endometritis glandularis resp. interstitialis durch die Diagnose Carcinoma resp. Sarcoma verdrängt ist, wir können also daher annehmen, dass zum Schaden der Kranken infolge unterlassener mikroskopischer Untersuchung nichts versäumt ist.

Was die Ausführung der Operation betrifft, so weicht dieselbe doch in einigen Punkten von der ab, wie die z. B. Vogelbach in seiner Arbeit als in der Baseler Klinik gebräuchliche schildert. Der Gang derselben hier ist kurz folgender.

Im grossen und ganzen dieselben Vorbereitungen, die Vogelbach angiebt. Auch hier möglichst der Zeitpunkt gewählt, dass man einige Tage nach Aufhören der Menstruation operiert. Am Tage vor der Operation ein Vollbad. Für Darmentleerung wird gesorgt. Nach

gründlicher Desinfection der Operationsgegend — Rasieren der Schamhaare unterbleibt auch hier — vaginale Ausspülung und energisches Ausreiben der Scheide sowie des cervix, soweit es zugänglich, mittelst Wattebauschs und der Finger. Angaben, ob Narkose angewendet wurde oder nicht, finden sich nur in den wenigsten Fällen, im allgemeinen wurde dies von der Empfindlichkeit der Kranken abhängig gemacht, sodann wurde die Operation auch häufig im Anschluss an die klinische Vorstellung, bei welcher Kaltenbach die Patientinnen stets chloroformieren liess, vorgenommen. Die Operation wird in Steissrückenlage ausgeführt. Nach Einführung eines Sims'schen Speculum wird die vordere Muttermundlippe angehakt und sanft heruntergezogen, alsdann wird eine Sondirung der Uterushöhle vorgenommen, um über die Weite oder abnorme Länge derselben Aufschluss zu erhalten. Es folgt die Einführung des schabenden Instrumentes, in unseren Fällen immer der gefensternten Curette. Ist ein Einführen derselben wegen der Enge des cervix unmöglich, so wird mittelst Hegarscher Hartgummistifte rasch dilatirt, in diesen Fällen stets in Narkose. Die Ausschabung selbst ist eine gründliche und wird nicht früher abgebrochen, als bis an allen Stellen die Schleimhaut sicher entfernt ist. Der Ausratzung folgt eine desinficirende Spülung mit einer schwachen Borsäurelösung mittelst des Uteruscatheters. Schon jetzt steht in den meisten Fällen die ohnehin nur geringe Blutung; immer wird jedoch, theils um eine etwa bestehende zu stillen, theils um eine Aetzung des cavum uteri vorzunehmen, früher zumeist mittelst der Braun'schen Spritze, in letzter Zeit immer mit Stäbchen, die mit Watte umwickelt sind, tinctura Jod. fort. in den Uterus-Innere gebracht. Nur in 2 Fällen steht die Blu-

tung nicht, ein Stillsand derselben wird hier durch Jodoformgazetamponade der Uterushöhle herbeigeführt. Was so die Operation vollendet, so wird noch ein Wattetampon in die Vagina eingelegt und die Patientinnen werden zu Bette gebracht. Weitere Aetzungen sind nur in Ausnahmefällen vorgenommen. Nach ungefähr 5 tägiger Bettruhe werden die Kranken mit der Verordnung Ergotin oder Hydrastis canadensis noch eine Zeit lang einzunehmen entlassen, sodann wird ihnen anempfohlen in der ersten Zeit sich möglichst aller körperlichen Anstrengungen zu enthalten.

Die oben erwähnten 198 Operationen verteilen sich auf die einzelnen Jahre folgendermassen. Operiert wurden:

im Jahre 1887	15
„ „ 1888	33
„ „ 1889	35
„ „ 1890	37
„ „ 1891	39
„ „ 1892	39

Von diesen 198 Fällen sollen zunächst 29 Fälle, bei denen eine Auskratzung wegen Endometritis infolge Myoma uteri vorgenommen wurde, nicht berücksichtigt werden; es sei mir gestattet, am Schluss auf diese besonders zurückzukommen. Demnach bleiben nur noch 169 Fälle, auch hiervon scheidet noch eine grosse Zahl aus. Bei circa 20 Fällen wurde garnicht versucht, Erkundigungen über das jetzige Befinden einzuziehen, weil die Angaben über Wohnungsverhältnisse, trotz eingehender Erkundigung auch auf der Verwaltung der Universität, höchst ungenau waren, sodann hatte eine Anzahl namentlich lediger Patientinnen ihren Wohnort zu Theil mehrfach gewechselt, sodass es unmöglich war

nachzukommen, wo sie sich zur Zeit aufhielten. So blieben mir nur 147, mit denen ich mich in Verbindung setzen konnte, die theils in hiesiger Stadt, zum grössten Theil jedoch in hiesiger Provinz ihren Wohnsitz haben. Nur bei 98 Fällen habe ich die erwünschte Auskunft erhalten können. Eine grosse Anzahl von Briefen kam als unbestellbar zurück. 7 Patientinnen sind inzwischen verstorben. Bei den Erkundigungen, die ich einzog, habe ich namentlich auf die subjectiven Klagen der Patientinnen vor der Operation geachtet und habe zwischen dem jetzigen Zustand und dem früheren einen Vergleich gezogen. Es fand sich, dass von den 98 Patientinnen führten:

- 55 Blutung als Hauptklage,
- 26 Blutung mit Schmerzen,
- 8 Blutung, Fluor, Schmerz,
- 9 Fluor, Schmerz.

Demnach ergibt sich, dass bei der grossen Mehrzahl der Kranken unregelmässige Blutungen den Beweggrund zur Operation bildeten. Der Einfachheit halber schien es empfehlenswert, ein Schreiben drucken zu lassen, in welchem nach diesem Punkte besonders gefragt wird; dieses Schreiben wurde alsdann allen Kranken zugesandt. Das von Vogelbach in Basel seinerzeit an die ihn interessirenden Kranken geschickte Formular hat mir als Muster gedient, nur geringe Abweichungen finden sich in dem meinigen. Es lautet.

Halle, im Juli 1894.

Der jetzige Direktor der hiesigen Frauenklinik, Herr Professor Fehling, wünscht zu wissen, ob die bei Ihnen im vorge-

nommene kleine Operation Sie von Ihren Beschwerden befreit hat.

Sie werden deshalb gebeten, die folgenden Fragen möglichst bald zu beantworten und die Antworten in dem beiliegenden Couvert der Frauenklinik zu übersenden.

1. Ist die Regel seit der Operation regelmäßig?

Antwort:

2. Wie viele Tage dauert die Regel?

Antwort:

3. Ist die Regel schwach oder stark?

Antwort:

4. Haben Sie seit der Operation schon wieder einmal geboren? Wann war die Geburt?

Antwort:

5. Ist es nach der Operation schon einmal unrichtig bei Ihnen gegangen? Wann war dies?

Antwort:

6. Fühlen Sie sich im ganzen wohl, oder haben Sie über etwas zu klagen?

Antwort:

Waren ausser der Blutung noch besondere Klagen angeführt, so wurde hiernach besonders gefragt.

Das Resultat meiner Nachforschungen ist folgende:

[Der besseren Uebersicht wegen theile ich meine Fälle in solche, bei denen nur eine einmalige und solche, bei denen eine mehrfache Auskratzung vorgenommen wurde.]

A. Einmalige Auskratzung.

85 Fälle.

Davon geheilt und von starken und unregelmässigen Blutungen, Schmerzen und Fluor dauernd frei geblieben.

68 Operierte (d. h. 80 %) und zwar

- 16 mit anschliessender oder bald eingetretener Menopause nach der Operation,
- 49 bei denen Periode jetzt regelmässig schwach und auch mittelstark ist, 3—4 Tage dauernd,
- 2 bei denen Periode schwach ist, aber 6 Tage dauert,
- 2 bei denen Periode antepönirend eintritt aber keineswegs stark ist.

Gebessert und auf gewisse Zeit geheilt 10 Fälle
h. 11,7 %

- + über ein Jahr lang gesund und ohne Klagen, jetzt starke menses,
- + gebessert insofern, als Blutungen zwar noch immer nicht regelmässig eintreten, aber an Stärke bedeutend abgenommen haben.

Ohne Erfolg operiert 7 Fälle, d. h. 8,2 %. Hier bestehen teils noch ganz unregelmässige Blutungen, teils sind sie 3 wöchentlich stark von 8 tägiger Dauer.

B. Mehrfache Auskratzungen.

10 zweimalige.

Davon mit gutem Erfolg beim zweiten Male

- + Periode jetzt regelmässig, 3—4 Tage dauernd, nicht stark; das erste Mal Erfolg für 2 Jahre,
- 2 Periode jetzt regelmässig; die erste Auskratzung Heilung auf 1 Jahr,

- 1, zum ersten Mal Erfolg für $\frac{1}{2}$ Jahr, nach der
2. Auskratzung bald amenorrhöisch,
- 3 auch zum zweiten Mal ohne Erfolg.

1 dreimalige.

Erfolg jedes Mal nur $\frac{1}{2}$ Jahr; jetzt amenorrhöisch.

1 viermalige.

Erfolg jedesmal immer circa vier Monate; jetzt amenorrhöisch.

1 siebenmalige.

Erfolg jedesmal nur kurze Zeit; jedesmal findet sich in den Krankengeschichten die Angabe, dass viel Massen aus dem Uterus entfernt wurden. Da die die Kranke sehr schwächenden Blutungen immer nach kurzer Zeit wieder auftraten Totalexstirpation uteri per vaginam. Bei der mikroskopischen Untersuchung fand sich eine gleichmässige Hypertrophie sämtlicher Teile der Uterusschleimhaut.

Als Gesamtergebnis erhalten wir somit:

76 dauernde Heilungen	77,5 %
10 vorübergehende Heilungen resp.	
Besserungen	10,2 %
12 Misserfolge	12,2 %

Diese Zahlen weichen im grossen und ganzen nur wenig ab von denen, welche Andere gefunden haben. In der Baseler Klinik gestaltete sich das Zahlenverhältnis folgendermassen:

Heilung dauernd	69,2 %
Vorübergehende Heilung resp. Besserung	21,5 %
Misserfolge	10,7 %

Bei solchen Ergebnissen ist die Operation durchaus empfehlenswert. Berücksichtigen wir noch den Umstand

ass von den 98 Patientinnen, die ausgekratzt wurden, alle nach Verlauf von spätestens 10 Tagen — meist schon nach 6—7 Tagen — aus der Klinik entlassen werden konnten und dass ferner nur eine einzige Patientin während dieser Zeit eine Temperatursteigerung über 40^0 nach vorausgegangenem Schüttelfrost zeigte — vielleicht war die Todesnachricht ihrer Mutter, welche dieser an jenem Tage mitgeteilt war, auf diesen Zustand nicht ohne Einfluss — bei 39 Patientinnen wurde eine zu keinerlei Beschwerden Veranlassung gebende Steigerung über 38^0 bis $38,6^0$ beobachtet, erwägen wir ferner, wie verhältnismässig einfach die Zurüstungen und Ausführung der Operation ist, so erscheint es durchaus geboten, nur das Curettement mit nachfolgender Jodbehandlung bei der Endometritis in Anwendung zu bringen.

Alle anderen Vorschläge, die zur Heilung dieser Erkrankung gemacht sind, sind zu verwerfen. Als ganz natürliche Folge der günstigen Ergebnisse ist es zu beobachten, dass die Mehrzahl der heutigen Operateure und Gynaekologen Deutschlands jetzt bei der Endometritis curettiert und dass das Curettement sich definitiv in die Praxis eingeführt hat.

Doch auch der Gefahren und Nachteile der Uterusausschabung muss hier noch kurz mit einem Worte gedacht werden. Zunächst die Perforationsgefahr beim Curettement. Dass eine solche besteht, soll nicht bestritten werden. Haynes (Am. Journ. Obst. New-York 1890 XXIII g. 129—131) berichtet im Jahre 1890 über zwei Fälle von Uterusperforation beim Curettement. Beide Patientinnen erkranken. Fourcand (Ref. Rép. univ. Paris 1891, No. 35, p. 556) hat im Jahre 1890 bei einer Patientin die Totalhysterectomie und zwar mit glücklichem Ausgang machen müssen, weil er bei der Uterusausschabung das Unglück

gehabt hatte, eine Perforation herbeizuführen. Ebenso hat Lanelogue zweimal den uterus perforiert (Archiv de tocol. et de gynecol. Paris 1892 Bd. XIX p. 395—97). In einem Falle erzielte er nach der Totalexstirpation Heilung, im anderen Falle konnte er sich hierzu nicht entschliessen, er säuberte zwar das Endometrium gründlich, trotzdem starb die Frau am 19. Tage an eitriger Peritonitis. Auch Kaltenbach erwähnte in seinen klinischen Vorträgen häufig, wie er selbst einmal beim Curettement ohne es selbst eigentlich zu bemerken, den Uterus perforiert habe, nur dem scharfen Aufpassen der Assistenten sei es zu danken gewesen, dass jeder weiterer Eingriff vermieden wurde und dass die Patientin nur kurze Zeit später, wie gewöhnlich, als geheilt entlassen werden konnte. Immerhin sind solche unglücklichen Zufälle doch sehr selten und können uns keine Veranlassung geben, anderen Methoden, welche — freilich nach anderer Richtung hin — viel gefahrvoller sind, den Vorzug zu geben.

Auch der Verschlimmerung, welche bei bestehender Exsudaten alten und neuen Datums, infolge des Curettements eintritt, wird von den Gegnern dieser Operation Erwähnung gethan. Dem können wir entgegen, dass bei solchen Fällen hier überhaupt nicht curettiert worden ist, ebenso wie die Auskratzung bei akuter Peri- und Parametritis als auch bei Oophoritis contraindiciert erscheint.

Den Vorwurf, dass die erkrankte Schleimhaut des Uterus nur zum Teil mit der Auskratzung entfernt werden könnte, haben, wie auch Vogelbach schon gesagt hat, die Cadaverversuche von Duvelius zurückgewiesen. Bei 22 Leichen curettirte er das Endometrium und fand, dass der uterus seiner Schleimhaut vollständig beraubt war.

Dass endlich eine spätere Conception infolge des Curettements weniger wahrscheinlich sei als nach andere

Operationsmethoden können wir nach den Erhebungen dieser Richtung hin keineswegs bestätigen. Im Gegenteil sind doch von den 79 Patientinnen, die hier in Betracht kommen (19 scheiden aus, weil sie nach der Operation bald amenorrhöisch) 24 wieder gravidæ geworden. Diese Zahl erscheint vielleicht noch höher, wenn wir berücksichtigen, dass von den erwähnten 79 Patientinnen eine ganze Reihe das 40. Lebensjahr schon überschritten hatte. Die 24 schwangeren verteilen sich folgendermassen:

1 Frau	4 Geburten	
1 „	2 „	1 Abort
8 Frauen	2 „	
3 „	1 Geburt	1 Abort
7 „	1 „	
1 Frau		3 Aborten
2 Frauen		1 Abort
1 Frau z. Z. grävda.		

Die Statistiken nach anderen Operationsmethoden sind keineswegs günstiger und so muss auch dieser Einwand als hinfällig fallen gelassen werden. Andere Einwendungen gegen die Uterusausschabung sind kaum vorgebracht worden; da diese nun sich zum grössten Teil ebenfalls als nichtig erweisen, so liegt kein Grund vor, von der hier üblichen Behandlungsweise der Endometritis abzugehen; die Erfolge derselben sind, wie aus dieser Zusammenstellung wohl zur Genüge hervorgeht, durchaus erfreulich.

Ganz anders sind die Erfolge der Auskratzung bei Myoma interstitiale.

Von den 15 Patienten die mir die gewünschte Auskunft gegeben haben sind:

3 mal ausgekratzt:

- 1 Frau. Erfolg jedesmal für circa 1 Jahr, jetzt dauernd frei von Beschwerden;

2 mal ausgekratzt:

- 6 Frauen. Von diesen gesund nach der 2. Auskratzung

2. [nach der 1. Auskratzung. Besserung für 1 Jahr

3 gebessert jedesmal für $1\frac{1}{2}$ Jahr

- 1 nach nur jedesmal 6 wöchentlicher Besserung
Totalexstirpatio uteri per vaginam;

1 mal ausgekratzt:

- 8 Frauen. Davon jetzt gesund oder wesentlich gebessert

3 ohne starke Blutungen jetzt,

1 gebessert „für lange Zeit“,

- 4 ohne Erfolg, in einem Falle ist die Myomotomie gemacht worden.

Wir haben demnach bei Myomen mit der Auskratzung nur in circa 40 % Heilung erzielt, vorübergehende Besserung in 27 %, keinen Erfolg in 33 % der Fälle. Sind diese Zahlen auch nicht ermutigend, so können sie uns doch keineswegs veranlassen, von der bisher üblichen Behandlungsart der interstitiellen Myome abzuweichen. Bei ungünstigem Erfolg bleibt die Myomotomie resp. die Totalexstirpatio uteri immer noch bestehen.

Thesen.

I.

Die Uterusausschabung ergibt bei der Endometritis fungosa die besten Resultate.

II.

Das unstillbare Erbrechen der Schwangeren giebt eine Anzeige für Einleitung der künstlichen Fehlgeburt.

III.

Die Prognose der Radicaloperation der Hernien durchaus günstig.

Lebenslauf.

Verfasser dieser Arbeit, Anton Alfred Heinrich Keil, evangelischer Konfession, wurde am 8. September 1868 in Erlangen geboren als Sohn des am 27. August 1894 zu Friedrichroda verstorbenen Geheimen Regierungsrates Dr. Heinrich Keil, Professor für das Fach der klassischen Philologie an der Universität Halle-Wittenberg, und seiner Ehefrau Luise geborenen Eckstein.

Seine erste Schulbildung erhielt er auf dem Stadtgymnasium zu Halle, sodann auf der Lateinischen Hauptschule der Frankeschen Stiftungen und erhielt hier Ostern 1889 das Zeugnis der Reife. Sodann widmete er sich auf den Universitäten Halle und Tübingen dem Studium der Medicin, bestand Ostern 1891 das tentamen physicum in Halle, absolvirte ebendasselbst im Prüfungsjahre 1893/94 die medicinische Staatsprüfung und unterzog sich am 21. Dezember 1894 dem Examen rigorosum. Seine Dienstpflicht als Einjährig-Freiwilliger genügte er vom 1. April bis 1. October 1889 beim I. Bataillon des Magd. Füs.-Reg. Nr. 36; seit dem 1. October 1894 dient er als Einjährig-Freiwilliger Arzt beim IV. Bataillon desselben Regiments.

Als Lehrer hörte er während seiner Studienzeit in Tübingen die Herren: Froriep, Grützner, Henke, L. v. Meyer;

in Halle die Herren: Ackermann, Bernstein, von
 ramann, Eberth, Eisler, Grenacher, Harnack,
 aym, von Herff, von Hippel, Kaltenbach†,
 noblauch, Kraus, Krause, Küssner†, von Mering,
 berst, Schirmer, Volhard, Weber, Welcker.

Durch die Güte des Herrn Professor von Bramann
 ar es ihm vergönnt, im Sommer-Semester 1892 eine
 olontairstelle an der chirurgischen Klinik inne zu haben.
 llen diesen Herren, besonders aber dem Herrn Pro-
 ssor Fehling, dem Verfasser die Anregung zu dieser
 rbeit und mannigfache Unterstützung bei der Anfer-
 gung derselben verdankt, sei an dieser Stelle bester
 ank gesagt.

